# SÉRIES NUMÉRIQUES

### I. Généralités

### 1. Série numérique

### **Définition 10.1**

Pour une suite numérique  $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ , on appelle **série de terme générale**  $u_n$  la suite  $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$  définie par

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad S_n = \sum_{k=0}^n u_k$$

- La notation  $\sum u_n$  (sans indice sous le signe somme) signifie "série de terme général  $u_n$ "
- Si  $(S_n)$  converge, on dit que la **série de terme général u**<sub>n</sub> converge, sinon on dit qu'elle **diverge**.
- Si  $(S_n)$  converge, alors on appelle **somme de la série de terme général**  $u_n$  et on note  $\sum_{k=0}^{+\infty} u_k$  la limite suivante :

$$\sum_{k=0}^{+\infty} u_k = \lim_{n \to +\infty} \sum_{k=0}^{n} u_k$$

- Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , le nombre  $S_n$  s'appelle **somme partielle de rang** n de la suite  $(u_n)$ .
- On parle de nature d'une série pour parler de la convergence ou la divergence de cette série.

### Remarque

La série de terme général  $u_n$  est convergente si la suite de ses sommes partielles converge. Attention, on note  $\sum_{k=0}^{+\infty} u_n$  uniquement si la série  $\sum u_n$  est convergente.

### Exemple 10.1

On considère la suite u définie pour tout  $n \in \mathbb{N}$  par  $u_n = \frac{1}{2^n}$ Alors la suite des sommes partielles  $(S_n)$  de la série de terme général  $u_n$  est définie par

$$S_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{2^n}$$
$$= \frac{1 - \frac{1}{2^n}}{1 - \frac{1}{2}}$$
$$= 2\left(1 - \frac{1}{2^n}\right)$$

Or,  $\lim_{n\to+\infty} 2^n = +\infty$  car 2 > 1 donc  $\lim_{n\to+\infty} S_n = 2$ . On en déduit que **la série de terme général**  $\frac{1}{2^n}$  **converge** et que

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{2^k} = 2$$

Le philosophe grec Zénon d'Élée a formulé un paradoxe qui peut trouver une réponse dans cet exemple : Zénon se tient à 2 mètres d'un arbre et lance une pierre sur celui-ci. Pour atteindre l'arbre, la pierre doit d'abord parcourir la moitié de la distance séparant Zénon de l'arbre, soit 1 mètres. Ensuite, elle doit parcourir la moitié de la distance restante, soit  $\frac{1}{2}$  mètres Puis, elle doit parcourir  $\frac{1}{4}$  de mètre, puis  $\frac{1}{8}$  de mètre, et ainsi de suite. La pierre ne pourra jamais frapper l'arbre puisqu'une infinité d'étape la sépareront toujours de cet objectif.



### 2. Propriétés immédiates

### Propriété 10.1

Soit  $(u_n)$  une suite numérique. Si la série de terme général  $u_n$  converge, alors  $\lim_{n \to +\infty} u_n = 0$ .

### Remarque

La réciproque est fausse. Considérons par exemple la série de terme général  $\frac{1}{n}$  appelée série harmonique.

La suite des sommes partielles est  $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ . On a bien  $\lim_{n \to +\infty} \frac{1}{n} = 0$ , mais montrons que  $(S_n)$  diverge. Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , on a

$$S_{2n} - S_n = \sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$$

$$= \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k}$$
 chaque terme est  $\geq \frac{1}{2n}$ 

$$\geq \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{2n}$$

$$\geq n \times \frac{1}{2n}$$

$$\geq \frac{1}{2}$$

Si la série harmonique convergeait, il existerait un réel  $\ell$  tel que  $\lim_{n \to +\infty} S_n = \lim_{n \to +\infty} S_{2n} = \ell$ , et on aurait donc  $\lim_{n \to +\infty} (S_{2n} - S_n) = \ell - \ell = 0$ .

Par passage à la limite dans l'inégalité précédente, on aurait alors  $0 \ge \frac{1}{2}$  ce qui est absurde. On en conclut que la série de terme général  $\frac{1}{n}$  diverge.

#### Définition 10.2

Si  $(u_n)$  est une suite numérique qui ne tend par vers 0, on dit que  $\sum u_n$  diverge grossièrement.

#### Propriété 10.2

Soient  $(u_n)$  et  $(v_n)$  deux suites numériques. Si  $\sum u_n$  et  $\sum v_n$  convergent, alors  $\sum (u_n + v_n)$  converge et on a alors :

$$\sum_{k=0}^{+\infty}(u_k+v_k)=\sum_{k=0}^{+\infty}u_k+\sum_{k=0}^{+\infty}v_k$$

### Propriété 10.3

Soit  $(u_n)$  une suite numérique et soit  $\lambda \in \mathbb{R}^*$ . Alors  $\sum u_n$  converge si et seulement si  $\sum \lambda u_n$  converge, et dans ce cas on a

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \lambda u_k = \lambda \sum_{k=0}^{+\infty} u_k$$



## II. Critère de convergence

### 1. Séries à terme positifs

### Propriété 10.4

Si  $(u_n)$  est une suite à termes positifs, la série  $\sum u_n$  converge si et seulement si la suite des sommes partielles associée est majorée.

### Remarque

Il n'existe pas de théorème comparable pour les séries dont le terme général n'est pas de signe constant. Ainsi, on peut montrer que la série  $\sum \frac{(-1)^n}{n}$  converge (voir exercice de cours n°12 du chapitre 6) bien que la série  $\sum \frac{1}{n}$  diverge.

### Remarque

La réciproque de la propriété précédente est vraie : si  $\sum u_n$  converge, alors la suite  $(S_n)$  des sommes partielles converge. Or toute suite convergente est bornée donc majorée, donc  $(S_n)$  est majorée.

### 2. Théorèmes de comparaison

### Théorème 10.5 de comparaison pour les séries positives -

Soient  $(u_n)$  et  $(v_n)$  deux suites numériques à termes positifs. Supposons que  $u_n \le v_n$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , alors

• Si la série  $\sum v_n$  converge, alors la série  $\sum u_n$  converge et de plus on a

$$\sum_{k=0}^{+\infty} u_k \le \sum_{k=0}^{+\infty} v_k$$

• Si la série  $\sum u_n$  diverge, alors la série  $\sum v_n$  diverge aussi

### Remarque

Ce théorème reste vrai si  $u_n \le v_n$  à partir d'un certain rang sauf qu'on n'a pas forcément l'inégalité des sommes  $\sum_{k=0}^{+\infty} u_k \le \sum_{k=0}^{+\infty} v_k$  dans le cas de convergence.

### Propriété 10.6

Si  $(u_n)$  une suite numérique **de signe quelconque** et que la série  $\sum |u_n|$  converge, alors la série  $\sum u_n$  converge. On dit alors que la série de terme général  $u_n$  est **absolument convergente.** 

### Remarque

La série de terme général  $\frac{(-1)^n}{n}$  est convergente (voir plus haut), mais la série de terme général  $\left|\frac{(-1)^n}{n}\right| = \frac{1}{n}$  diverge (c'est la série harmonique).

Ainsi, la réciproque de la propriété précédente est fausse : une série peut être convergente sans être absolument convergente.

### Théorème 10.7 de comparaison pour les séries positives

Si  $(u_n)$  et  $(v_n)$  sont deux suites numériques à termes positifs telles que  $u_n = o(v_n)$ , alors :

- Si  $\sum v_n$  converge, alors  $\sum u_n$  converge aussi
- Si  $\sum u_n$  diverge, alors  $\sum v_n$  diverge aussi.

### Théorème 10.8 de comparaison pour les séries positives

Si  $(u_n)$  et  $(v_n)$  sont deux suites numériques **à termes positifs** telles que  $u_n \underset{n \to +\infty}{\sim} v_n$ , alors les séries  $\sum u_n$  et  $\sum v_n$  sont de même nature (soit toutes les deux convergentes, soit toutes les deux divergentes).



# III. Séries de référence et conséquences

### 1. Séries géométriques

### Définition 10.3

Une série géométrique est une série de terme général  $x^n$  avec  $x \in \mathbb{R}$ .

### Remarque

Une série géométrique n'est pas forcément à termes positifs.

### Propriété 10.9

Soit  $x \in \mathbb{R}$ . La série géométrique  $\sum x^n$  converge si et seulement si |x| < 1, et dans ce cas on a :

$$\sum_{k=0}^{+\infty} x^k = \frac{1}{1-x}$$

→ Exercice de cours nº 1.

### Théorème 10.10 (Critère de d'Alembert)

Soit  $(u_n)$  est une série à termes strictement positifs telle que  $\lim_{n\to+\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\ell$  avec  $\ell\in[0;+\infty[$ .

- Si  $\ell > 1$ , alors la série de terme général  $u_n$  diverge
- Si  $0 \le \ell < 1$ , alors la série de terme général  $u_n$  converge
- Si  $\ell = 1$ , on ne peut rien dire.

#### Remarque

Le résultat est encore vrai si  $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$  est strictement positive à partir d'un certain rang seulement.

- → Exercice de cours nº 2.
- → Exercice de cours nº 3.

### Remarque

Si  $\lim_{n\to+\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=1$  on ne peut rien conclure : considérons par exemple la série de terme général  $a_n=\frac{1}{n}$  et la série

de terme général 
$$b_n = \frac{1}{n(n+1)}$$

On a 
$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n}{n+1} \to 1$$
 et  $\frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{n(n+1)}{(n+1)(n+2)} = \frac{n}{n+2} \to 1$ .

Pourtant la série de terme général  $a_n$  est divergente, et la série de terme général  $b_n$  est convergente.

En effet, la série de terme général  $a_n$  est la série harmonique (voir partie 1), quand à la série de terme général  $b_n$ , la somme partielle d'ordre n est :

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)}$$
$$= \sum_{k=1}^n \left( \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right)$$
$$= 1 - \frac{1}{n+1}$$

par sommes téléscopiques

donc  $(S_n)$  converge et  $\lim_{n\to+\infty} S_n = 1$ , la série de terme général  $b_n = \frac{1}{n(n+1)}$  est donc convergente.



### Propriété 10.11 (série géométrique dérivée) –

Soit x un réel. La série  $\sum_{n\geq 1} nx^{n-1}$  converge si et seulement si |x|<1, et dans ce cas on a

$$\sum_{k=1}^{+\infty} k x^{k-1} = \frac{1}{(1-x)^2}$$

### Propriété 10.12 (série géométrique dérivée d'ordre 2)

Soit x un réel. La série  $\sum_{n\geq 2} n(n-1)x^{n-2}$  converge si et seulement si |x|<1, et dans ce cas on a

$$\sum_{k=2}^{+\infty} k(k-1)x^{k-2} = \frac{2}{(1-x)^3}$$

### 2. Série exponentielle

### **Définition 10.4**

Soit  $x \in \mathbb{R}$ . La série de terme général  $\frac{x^n}{n!}$  s'appelle la **série exponentielle de paramètre** x.

### Propriété 10.13

Quel que soit  $x \in \mathbb{R}$ , la série exponentielle de terme général  $\frac{x^n}{n!}$  converge, et

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x$$

### 3. Séries de Riemann

### **Définition 10.5**

On appelle séries de Riemann les séries de la forme  $\sum_{n\geq 1}\frac{1}{n^{\alpha}}$  où  $\alpha\in\mathbb{R}$ .

### Propriété 10.14 -

La série de Riemann  $\sum_{n\geq 1} \frac{1}{n^{\alpha}}$  converge si et seulement si  $\alpha>1$ .

### Exemple 10.2

La série  $\sum \frac{1}{n^3}$  converge et la série  $\sum \frac{1}{\sqrt{n}}$  diverge. La série  $\sum \frac{1}{n^{-1}}$  diverge grossièrement.

### Théorème 10.15 (critère de Riemann) -

Soit  $(u_n)$  une suite à termes positifs.

- S'il existe un réel  $\alpha > 1$  et un réel  $\ell$  quelconque tel que  $\lim_{n \to +\infty} n^{\alpha} u_n = \ell \in \mathbb{R}$ , alors  $\sum u_n$  converge.
- S'il existe un réel  $\alpha \le 1$  et un réel non nul  $\ell$  tel que  $\lim_{n \to +\infty} n^{\alpha} u_n = \ell$  ou  $\lim_{n \to +\infty} n^{\alpha} = +\infty$  alors  $\sum u_n$  diverge.

#### → Exercice de cours nº 4.



# IV. Séries double

### Propriété 10.16 (admise) -

Soit  $(a_{i,j})_{(i,j)\in\mathbb{N}^2}$  une famille de réels positifs. On a

$$\sum_{i=0}^{+\infty} \sum_{j=0}^{+\infty} a_{i,j} = \sum_{j=0}^{+\infty} \sum_{i=0}^{+\infty} a_{i,j}$$

dans le sens où tout converge à gauche si et seulement si tout converge à droite. Les sommes sont égales en cas de convergence, et sont toutes deux infinies en cas de divergence.

 $\rightarrow$  Exercice de cours nº 5.



### Exercices de cours

Exercice 1

Montrer que  $\sum \frac{(-3)^n}{7^n}$  converge et calculer  $\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-3)^k}{7^k}$ .

Exercice 2

On considère la suite  $(u_n)$  définie pour tout  $n \in \mathbb{N}$  par  $u_n = \frac{(n+1)^2}{n!}$ . Étudier la nature de la série de terme général  $u_n$ .

Exercice 3

On considère la suite  $(u_n)$  définie pour tout  $n \in \mathbb{N}$  par  $u_n = (3n+1)\left(\frac{3}{5}\right)^n$ . Étudier la nature de la série de terme général  $u_n$ .

**Exercice 4** 

Étudier la nature de la série de terme général  $u_n$  dans les cas suivant :

- 1.  $u_n = e^{-n^2}$
- 2.  $u_n = \frac{1}{\sqrt{n^5 + 1}}$
- $3. \ u_n = \frac{1}{\sqrt{n} \ln(n)}$

Exercice 5 -

Montrer que la série double  $\sum_{i\geq 0}\sum_{j\geq 0}\frac{1}{2^{i+j}}$  converge et calculer  $\sum_{i=0}^{+\infty}\sum_{j=0}^{+\infty}\frac{1}{2^{i+j}}$