### Sous-espaces vectoriels

## Exercice 1

Déterminer dans chaque cas si F est un sous-espace vectoriel de E ou non.

- 1)  $E = \mathbb{R}^3$ ,  $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 4x 2y + z = 0\}$
- 2)  $E = \mathbb{R}^4$ ,  $F = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x t = y + 2z \text{ et } x + y = 0\}$
- 3)  $E = \mathbb{R}^2$ ,  $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 = y^2\}$
- 4)  $E = \mathbb{R}^3$ ,  $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$
- 5)  $E = \mathbb{R}^3$ ,  $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = 0\}$
- 6)  $E = \mathbb{R}^2$ ,  $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + 3y = 0\}$
- 7)  $E = \mathbb{R}^n$ ,  $F = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid \sum_{k=1}^n x_k = 0\}$
- 8)  $E = \mathbb{R}^n$ ,  $F = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid \sum_{k=1}^n (-1)^k x_k^2 = 0\}$

## Exercice 2

On note  $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$  l'ensemble des applications de  $\mathbb{R}$  vers  $\mathbb{R}$  et on admet que  $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$  est un  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel. Les ensembles suivant sont-ils des sous-espaces vectoriels de E?

- 1) L'ensemble F des fonctions continues sur  $\mathbb{R}$
- 2) L'ensemble F des fonctions paires sur  $\mathbb{R}$
- 3) L'ensemble F des fonctions impaires sur  $\mathbb{R}$
- 4) L'ensemble F des fonctions périodiques sur  $\mathbb R$
- 5) L'ensemble F des fonctions f telles que  $\lim_{x\to +\infty} = 0$ .
- 6) L'ensemble F des polynômes de degré 2
- 7) L'ensemble F des fonctions de la forme  $x \mapsto e^{ax}$  avec  $a \in \mathbb{R}$ .

# Exercice 3

Soit  $n \in \mathbb{N}$ , on considère l'espace vectoriel  $E = \mathbb{R}_n[X]$ . Déterminer dans chacun des cas suivant si F est un sous-espace vectoriel de E ou non :

- 1)  $F = \{ P \in \mathbb{R}_n[X] \mid P(0) = P(1) \}$
- 2)  $F = \{ P \in \mathbb{R}_n[X] \mid \exists a \in \mathbb{R}, P(a) = 0 \}$

- 3)  $F = \{ P \in \mathbb{R}_n[X] \mid 1 < \deg(P) < n \}$
- 4)  $F = \{ P \in \mathbb{R}_n[X] \mid \exists Q \in \mathbb{R}_n[X], P = XQ'(X) \}$

### Exercice 4 -

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ , on considère l'espace vectoriel  $E = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ . Déterminer dans chacun des cas suivant si F est un sous-espace vectoriel de E ou non :

- 1)  $F = \{ M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid {}^tM + \operatorname{tr}(M)I = 0 \}$
- $2) F = \{ M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid M^2 = I \}$
- 3)  $F = \{ M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid M^2 = 0 \}$

- 4)  $F = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid AM = 0\}$  avec  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  fixée.
- 5)  $F = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid \exists N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), AN = M\}$  avec  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  fixée.

#### Familles libres, familles génératrices, bases

Exercice 5

On considère l'espace vectoriel  $E = \mathbb{R}^3$ . Déterminer dans chaque cas si la famille (u, v, w) est libre ou liée.

- 1) u = (3, -2, 1), v = (1, 2, 3) et w = (-4, 1, 5)
- 3) u = (1,0,1), v = (0,1,0) et w = (0,0,1)
- 2) u = (1, 1, 3), v = (4, 2, 5) et w = (-1, 1, 4)
- 4) u = (1, 1, 1), v = (3, 0, 3) et w = (0, 3, 0)

## Exercice 6

Soit  $F = \text{Vect}((-4, 1, 3)) \subset \mathbb{R}^3$  et  $G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0 \text{ et } 4x - 2y + 6z = 0\}$ 

- 1) Montrer que G est un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^3$ .
- 2) Montrer que  $F \subset G$ .
- 3) Montrer que F = G



Soit  $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$  l'espace vectorielles des applications de  $\mathbb{R}$  vers  $\mathbb{R}$ .

- 1) Montrer que la famille ( $\cos, \sin$ ) est libre dans E
- 2) Soient  $0 < a_1 < a_2 < \cdots < a_n$  une famille de n réels. Montrer que  $(x \mapsto \sin(a_i x))_{1 \le i \le n}$  est une famille libre.



Dans chaque cas déterminer une base de E

1) 
$$E = \begin{cases} (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid \begin{cases} x + y + z + t &= 0 \\ x + y + 2z + 3t &= 0 \end{cases}$$

$$1) \ E = \left\{ (x,y,z,t) \in \mathbb{R}^4 \mid \left\{ \begin{array}{rcl} x+y+z+t & = & 0 \\ x+y+2z+3t & = & 0 \end{array} \right\} \right. \\ 4) \ E = \left\{ (x,y,z,t) \in \mathbb{R}^4 \mid \left\{ \begin{array}{rcl} x+y+z+t & = & 0 \\ x-y+z+t & = & 0 \\ x+y+z-t & = & 0 \end{array} \right\} \right. \\ \left. \left\{ \begin{array}{rcl} x+y+z+t & = & 0 \\ x+y+z-t & = & 0 \end{array} \right\} \right. \\ \left. \left\{ \begin{array}{rcl} x+y+z+t & = & 0 \\ x+y+z-t & = & 0 \end{array} \right\} \right. \\ \left. \left\{ \begin{array}{rcl} x+y+z+t & = & 0 \\ x+y+z-t & = & 0 \end{array} \right\} \right. \\ \left. \left\{ \begin{array}{rcl} x+y+z+t & = & 0 \\ x+y+z-t & = & 0 \end{array} \right\} \right. \\ \left. \left\{ \begin{array}{rcl} x+y+z+t & = & 0 \\ x+y+z-t & = & 0 \end{array} \right\} \right. \\ \left. \left\{ \begin{array}{rcl} x+y+z+t & = & 0 \\ x+y+z-t & = & 0 \end{array} \right\} \right. \\ \left. \left\{ \begin{array}{rcl} x+y+z+t & = & 0 \\ x+y+z-t & = & 0 \end{array} \right\} \right. \\ \left. \left\{ \begin{array}{rcl} x+y+z+t & = & 0 \\ x+y+z-t & = & 0 \end{array} \right\} \right. \\ \left. \left\{ \begin{array}{rcl} x+y+z+t & = & 0 \\ x+y+z-t & = & 0 \end{array} \right\} \right. \\ \left. \left\{ \begin{array}{rcl} x+y+z+t & = & 0 \\ x+y+z-t & = & 0 \end{array} \right\} \right. \\ \left. \left\{ \begin{array}{rcl} x+y+z+t & = & 0 \\ x+y+z-t & = & 0 \end{array} \right\} \right. \\ \left. \left\{ \begin{array}{rcl} x+y+z+t & = & 0 \\ x+y+z-t & = & 0 \end{array} \right\} \right. \\ \left. \left\{ \begin{array}{rcl} x+y+z+t & = & 0 \\ x+y+z-t & = & 0 \end{array} \right\} \right. \\ \left. \left\{ \begin{array}{rcl} x+y+z+t & = & 0 \\ x+y+z-t & = & 0 \end{array} \right\} \right. \\ \left. \left\{ \begin{array}{rcl} x+y+z+t & = & 0 \\ x+y+z-t & = & 0 \end{array} \right\} \right. \\ \left. \left\{ \begin{array}{rcl} x+y+z+t & = & 0 \\ x+y+z-t & = & 0 \end{array} \right\} \right. \\ \left. \left\{ \begin{array}{rcl} x+y+z+t & = & 0 \\ x+y+z-t & = & 0 \end{array} \right\} \right. \\ \left. \left\{ \begin{array}{rcl} x+y+z+t & = & 0 \\ x+y+z-t & = & 0 \end{array} \right\} \right. \\ \left. \left\{ \begin{array}{rcl} x+y+z+t & = & 0 \\ x+y+z-t & = & 0 \end{array} \right\} \right. \\ \left. \left\{ \begin{array}{rcl} x+y+z+t & = & 0 \\ x+y+z-t & = & 0 \end{array} \right\} \right. \\ \left. \left\{ \begin{array}{rcl} x+y+z+t & = & 0 \\ x+y+z-t & = & 0 \end{array} \right\} \right. \\ \left. \left\{ \begin{array}{rcl} x+y+z+t & = & 0 \\ x+y+z-t & = & 0 \end{array} \right\} \right. \\ \left. \left\{ \begin{array}{rcl} x+y+z+t & = & 0 \\ x+y+z-t & = & 0 \end{array} \right\} \right. \\ \left. \left\{ \begin{array}{rcl} x+y+z+t & = & 0 \\ x+y+z-t & = & 0 \end{array} \right\} \right. \\ \left. \left\{ \begin{array}{rcl} x+y+z+t & = & 0 \\ x+z+t & = & 0 \end{array} \right\} \right. \\ \left. \left\{ \begin{array}{rcl} x+y+z+t & = & 0 \\ x+z+t & = & 0 \end{array} \right\} \right. \\ \left. \left\{ \begin{array}{rcl} x+y+z+t & = & 0 \\ x+z+t & = & 0 \end{array} \right\} \right. \\ \left. \left\{ \begin{array}{rcl} x+z+t & = & 0 \\ x+z+t & = & 0 \end{array} \right\} \right. \\ \left. \left\{ \begin{array}{rcl} x+y+z+t & = & 0 \\ x+z+t & = & 0 \end{array} \right\} \right. \\ \left. \left\{ \begin{array}{rcl} x+z+t & = & 0 \\ x+z+t & = & 0 \end{array} \right. \\ \left. \left\{ \begin{array}{rcl} x+z+t & = & 0 \\ x+z+t & = & 0 \end{array} \right. \\ \left. \left\{ \begin{array}{rcl} x+z+t & = & 0 \end{array} \right\} \right. \\ \left. \left\{ \begin{array}{rcl} x+z+t & = & 0 \\ x+z+t & = & 0 \end{array} \right. \\ \left. \left\{ \begin{array}{rcl} x+z+t & =$$

2) 
$$E = \left\{ (x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid \left\{ \begin{array}{rcl} x + 2y & = & 0 \\ -x + 3y & = & 0 \end{array} \right\} \right.$$

5) 
$$E = \left\{ (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid \left\{ \begin{array}{rcl} x - y - 3z - t & = & 0 \\ 2x - y - 5z + t & = & 0 \end{array} \right\} \right.$$

3) 
$$E = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \left\{ \begin{array}{ccc} x - y + 2z & = & 0 \\ 4x + y - z & = & 0 \end{array} \right\} \right.$$

#### Exercice 9

On considère  $F = \text{Vect}((3, -2, 4), (5, 0, 6), (3, 8, 2)) \subset \mathbb{R}^3$ . Déterminer la dimension de F.

Exercice 10

Soient u = (1, 0, 1), v = (1, 1, 0) et w = (0, 1, 1) trois vecteurs de  $\mathbb{R}^3$ .

- 1) Montrer que (u, v, w) constitue une base de  $\mathbb{R}^3$
- 2) Exprimer les coordonnées des vecteurs x = (3, 1, 2) et y = (0, 0, 4) dans la base (u, v, w).

— Exercice 11 -

Soit  $E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - 2y + z = 0\}$ . Déterminer une base de E.

— Exercice 12 -

Soit  $F = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ b & b \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \mid (a,b) \in \mathbb{R}^2 \right\}$ . Montrer que F est un sous-espace vectoriel de  $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$  et déterminer sa dimension.

Exercice 13

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ , on considère l'espace vectoriel  $E = \mathbb{R}_n[X]$  et l'ensemble  $F = \{P \in \mathbb{R}_n[X] \mid P(1) = 0\}$ .

- 1) Montrer que F est un sous-espace vectoriel de E
- 2) Montrer que  $\dim(F) = n$ .



Exercice 14

Soit  $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$  et soit  $\mathcal{C}(A) = \{M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \mid AM = MA\}$ . L'ensemble  $\mathcal{C}(A)$  s'appelle le **commutant** de A.

- 1) Montrer que  $\mathcal{C}(A)$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ .
- 2) Soit  $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ . Montrer que  $M \in \mathcal{C}(A)$  si et seulement si a = d et b = -c.
- 3) En déduire  $\dim(\mathcal{C}(A))$ .

## Applications linéaires

# Exercice 15

Dans chaque cas, déterminer si l'application  $\varphi$  est linéaire ou non.

Si  $\varphi$  est linéaire, déterminer son noyau et son image.

1) 
$$\varphi: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2, \forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \quad \varphi(x, y, z) = (x + z, y - z)$$

2) 
$$\varphi: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}, \forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \quad \varphi(x, y, z) = xy + 2z$$

3) 
$$\varphi: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, \ \forall (x,y) \in \mathbb{R}^2, \ \varphi(x,y) = 3y - x$$

4) 
$$\varphi: \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4, \forall (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4, \varphi(x, y, z, t) = (x + 2t, z + x + y, 3 - 2t, 5x)$$

Exercice 16

Soit  $E={\rm Vect}\,((4,1,-1),(2,0,2))$  un sous espace vectoriel de  $R^3$ . On considère l'application  $f:E\to\mathbb{R}^2$  définie par

$$\forall (x, y, z) \in E, \quad f(x, y, z) = (x - y, y + z)$$

- 1) Montrer que f est une application linéaire de E vers  $\mathbb{R}^2$ .
- 2) Montrer que  $(1,0) \in \operatorname{Im}(f)$  et  $(0,1) \in \operatorname{Im}(f)$
- 3) En déduire que f est surjective
- 4) Déterminer Ker(f)
- 5) En déduire que f est injective.

Exercice 17

Soit  $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid -\sqrt{3}x + y = 0\}$  et  $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y = 0\}$ On considère l'application  $\varphi$  définie sur E par

$$\forall (x,y) \in E, \quad \varphi(x,y) = \left( (\sqrt{6} - \sqrt{2})x - (\sqrt{6} + \sqrt{2})y , (\sqrt{6} + \sqrt{2})x + (\sqrt{6} - \sqrt{2})y \right)$$

- 1) Montrer que  $\varphi$  est une application linéaire de E dans  $\mathbb{R}^2$
- 2) Montrer que  $\varphi$  est une application linéaire de E dans F

\* \* Exercice 18

Soit E un  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel et soit  $f \in \mathcal{L}(E)$  un endomorphisme de E. On note  $f^2 = f \circ f$ .

- 1) Montrer que  $Ker(f) \subset Ker(f^2)$ .
- 2) Montrer que  $\operatorname{Im}(f^2) \subset \operatorname{Im}(f)$
- 3) Montrer que  $\operatorname{Ker}(f) = \operatorname{Ker}(f^2) \iff \operatorname{Im}(f) \cap \operatorname{Ker}(f) = \{0_E\}$

\* \* Exercice 19

Soit E un  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel et soit  $f \in \mathcal{L}(E)$  telle que  $f^2 = f \circ f = 0$ . Montrer que  $\operatorname{rg}(f) \leq \frac{\dim(E)}{2}$ 



## Exercice 20

Soit E un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^n$  et F un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^m$ . Soit  $f \in \mathcal{L}(E,F)$ .

- 1) Si f est injective et que  $(u_1, u_2, \dots u_p)$  est une famille libre de E, montrer que  $(f(u_1), f(u_2), \dots, f(u_p))$  est une famille libre de F.
- 2) Si f est surjective et que  $(u_1, u_2, \dots, u_p)$  est une famille génératrice de E, montrer que  $(f(u_1), f(u_2), \dots, f(u_n))$  est une famille génératrice de F.
- 3) Que peut-on en déduire si f est bijective?



Soit  $\theta \in \mathbb{R}$ . On considère l'application  $\varphi_{\theta} : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$  par

$$\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2, \quad \varphi_{\theta}(x,y) = (x\cos\theta - y\sin\theta, x\sin\theta + y\cos\theta)$$

- 1) Montrer que  $\varphi_{\theta} \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2)$ .
- 2) Pour quelle(s) valeur(s) de  $\theta$  a-t-on  $\varphi_{\theta} = id_{\mathbb{R}^2}$ ?
- 3) Pour quelle(s) valeur(s) de  $\theta$  a-t-on  $\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2, \ \varphi_{\theta}(x,y) = -(x,y)$
- 4) Existe-t-il une valeur de  $\theta$  telle que  $\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2, \ \varphi_{\theta}(x,y) = (-x,y)$ ?
- 5) Soit M(x,y) un point du plan muni d'un repère, et soit M' le point dont les coordonnées sont données par  $\varphi_{\theta}(x,y)$ .
  - a) Montrer que si M appartient au cercle de centre 0 et de rayon 1, alors M' aussi.
  - b) On pose  $\theta = \frac{\pi}{3}$ . Représenter l'image de (0,1), de (1,0) et de (-1,0) par  $\varphi_{\theta}$ .
  - c) Quelle est la transformation du plan correspondant à  $\varphi_{\theta}$  pour  $\theta$  quelconque.



Soit E un espace vectoriel de dimension n et H un sous-espace vectoriel de E. On dit que H est **un hyperplan de** E si  $\dim(H) = n - 1$ .

- 1) Soit  $\varphi \in \mathcal{L}(E,\mathbb{R})$  une forme linéaire non nulle. Montrer que  $\operatorname{Ker}(\varphi)$  est un hyperplan de E.
- 2) Soit H un hyperplan de E. Montrer qu'il existe une application  $\varphi \in \mathcal{L}(E,\mathbb{R})$  telle que  $H = \mathrm{Ker}(\varphi)$ .

# Exercice 23

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . On considère l'application f qui à tout polynôme P associe le polynôme P(1-X).

- 1) Montrer que f définit un endomorphisme de  $\mathbb{R}_n[X]$ .
- 2) Montrer que  $f^2 = \mathrm{id}_{\mathbb{R}_n[X]}$ . En déduire que f est un automorphisme de  $\mathbb{R}_n[X]$ .

Exercice 24

Soit f l'application qui à tout polynôme P associe P(X+1)-P(X).

- 1) Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . Montrer que f définit une application linéaire de  $\mathbb{R}_n[X]$  dans  $\mathbb{R}_{n-1}[X]$ .
- 2) Déterminer Ker(f), puis en déduire Im(f) par un argument sur les dimensions.

Exercice 25

Existence et unicité des polynômes interpolateurs de Lagrange : soient  $(x_1, x_2, ..., x_n)$  une famille de n réels deux à deux distincts et  $(y_1, y_2, ..., y_n)$  une famille de n réels. On considère l'application

$$\varphi: \mathbb{R}_{n-1}[X] \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

$$P \longmapsto (P(x_1), P(x_2), ..., P(x_n))$$

- 1) Montrer que  $\varphi$  est une application linéaire de  $\mathbb{R}_{n-1}[X]$  dans  $\mathbb{R}^n$ .
- 2) Montrer que  $\operatorname{Ker}(\varphi) = \{0_{\mathbb{R}_{n-1}[X]}\}$ . En déduire que  $\varphi$  est un isomorphisme.
- 3) Justifier qu'il existe un unique polynôme  $P \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$  tel que  $\forall i \in [1, n], P(x_i) = y_i$ .



On considère l'application suivante :

$$f: \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$$

$$M \longmapsto M - {}^t M$$

- 1) Montrer que f est un endomorphisme de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ .
- 2) À quel sous-espace vectoriel de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  correspond  $\operatorname{Ker}(f)$ ?
- 3) En déduire Im(f).



Soit A une matrice de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  non nulle fixée. On considère l'application :

$$f: \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$$

$$M \longmapsto \operatorname{tr}(A)M - \operatorname{tr}(M)A$$

- 1) Montrer que f est une application linéaire.
- 2) Montrer que si tr(A) = 0 alors  $dim(Ker(f)) = n^2 1$
- 3) Montrer que si  $tr(A) \neq 0$ , alors dim(Ker(f)) = 1
- 4) Montrer que  $f^2 = \operatorname{tr}(A)f$ .



Soit  $n \geq 2$  un entier.

- 1) Soit  $E = \{ P \in \mathbb{R}_{n-1}[X], P(0) = 0 \}$ , montrer que dim(E) = n 1
- 2) Déterminer le noyau de l'application  $f: \mathbb{R}_n[X] \to \mathbb{R}_n[X], P \mapsto XP''(X)$
- 3) En déduire que Im(f) = E.
- 4) Montrer que si P est un polynôme de degré n-1 qui s'annule en 0 alors il existe un polynôme Q de degré n tel que P(X) = XQ''(X).



Soit E un  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension 3. Soit g un endomorphisme de E. On note  $0_{\mathcal{L}(E)}$  l'endomorphisme nul de E qui à tout vecteur x associe le vecteur nul  $0_E$ . Pour tout entier  $n \geq 1$ , on note  $g^n = \underbrace{g \circ g \circ \cdots \circ g}_{n \text{ fois}}$ . Par exemple,  $g^2 = g \circ g$ 

et  $g^3 = g \circ g \circ g$ .

Si A et B sont deux ensembles, on note  $A \subseteq B$  si  $A \subset B$  avec  $A \neq B$ .

- 1) Montrer que  $Ker(g) \subset Ker(g^2) \subset Ker(g^3)$
- 2) On suppose désormais que  $g^3 = 0_{\mathcal{L}(E)}$  et que  $\{0_E\} \subsetneq \operatorname{Ker}(g) \subsetneq \operatorname{Ker}(g^2) \subsetneq \operatorname{Ker}(g^3)$ .
  - a) Déterminer  $Ker(q^3)$
  - b) Déterminer  $\dim(\text{Ker}(g))$ ,  $\dim(\text{Ker}(g^2))$  et  $\dim(\text{Ker}(g^3))$ .
  - c) Montrer que  $\operatorname{Im}(g) \subset \operatorname{Ker}(g^2)$  puis que  $\operatorname{Im}(g) = \operatorname{Ker}(g^2)$ .
- 3) Soit  $a \in \text{Ker}(g)$  un vecteur non nul. Montrer qu'il existe  $b \in E$  tel que g(b) = a. Montrer que  $b \in \text{Ker}(g^2)$  et en déduire que (a, b) est une famille libre.
- 4) Montrer qu'il existe  $c \in E$  tel que g(c) = b.
- 5) Montrer que (a, b, c) est alors une base de E. Préciser les décompositions de g(a), g(b) et g(c) dans cette base.

