
Programme de khôlle n° 19

Semaine du 16 Mars

Cours

• Chapitre 11 : Espaces vectoriels

- \mathbb{R} -espaces vectoriels, structure d'espace vectoriel de \mathbb{R}^n , de $\mathbb{R}_n[X]$, de $\mathcal{M}_{n,m}(\mathbb{R})$ et de l'ensemble des fonctions d'une partie de \mathbb{R} dans \mathbb{R} .
- Sous-espaces vectoriels, s-e.v. engendrés par une famille de vecteurs, l'ensemble des solutions d'un système linéaire homogène à p inconnues est un sous-espace vectoriel de \mathbb{R}^p . L'intersection de 2 s-e.v. est un s-e.v.. Droites vectorielles. Les sous-espaces vectoriels de \mathbb{R}^2 sont $\{0\}$, les droites vectorielles, et \mathbb{R}^2 .
- Famille génératrice, famille libre, base. Théorème de la base incomplète, dimension. Décomposition unique d'un vecteur dans une base. Une famille libre d'un e.v. de dimension n a au plus n éléments avec égalité ssi c'est une base, une famille génératrice d'un e.v. de dimension n a au moins n éléments avec égalité ssi c'est une base. Si $F \subset E$ alors $\dim(F) \leq \dim(E)$ avec égalité ssi $F = E$.
- Base et dimension de $\mathbb{R}_n[X]$ et de $\mathcal{M}_{n,m}(\mathbb{R})$. Une famille de polynômes échelonnées en degré est libre.
- Applications linéaires : somme, produit par un réel, composition. Noyau et image. Injection, surjections et bijections.

Questions de cours et exercice

• Questions de cours

- Si u_1, \dots, u_p sont des vecteurs d'un \mathbb{R} -e.v. E alors $\text{Vect}(u_1, \dots, u_p) = \{\sum_{k=1}^p \lambda_k e_k \mid (\lambda_1, \dots, \lambda_p) \in \mathbb{R}^p\}$ est un sous-espace vectoriel de E .
- L'ensemble des solutions d'un système homogène linéaire à coefficients réels à p inconnues est un sous-espace vectoriel de \mathbb{R}^p .
- L'intersection de deux sous-espaces vectoriels est un sous-espace vectoriel.
- Si E et F sont des R -e.v. et $f \in \mathcal{L}(E, F)$, alors $\text{Ker}(f)$ est un sous-espace vectoriel de E .
- Si E et F sont des R -e.v. et $f \in \mathcal{L}(E, F)$, alors $\text{Im}(f)$ est un sous-espace vectoriel de F .
- Si E et F sont des R -e.v. et $f \in \mathcal{L}(E, F)$, alors f est injective si et seulement si $\text{Ker}(f) = \{0_E\}$.